

اسپری بینی بتادین

تکنولوژی
درمانی جدید
در دنیا

جهت
بهبودی سریع
بعد از جراحی
زیبایی بینی



فقدان بینی حاوی ۱۲ لیتر کلسترول
فقدان بینی برای کمک به درمان استنشاقی از
نشانهای ریزش بینی از حساسیت، ریه
بازسازی بخار حساس بینی را فراهم میکند و
از آن در برابر عوامل حساسیت زا و ذرات
معلق محافظت میکند. حاوی Ectoin®
موتیکول، طبیعی محافظ سلول است که فضای
طبیعی محافظ بینی را تقویت می کند.
روش مصرف:
درواز بازشدگی را از روی آنز، بردارید. در
محیطی نوبت مصرف، پسوند را به سمت
پایین فشار دهید و رها کنید تا مقداری از
محتویات فاشه خارج شود. بطوری را صورتی
نگه دارید و آنرا را وارد سوراخ بینی کنید.
پسوند را فشار دهید و همزمان از طریق بینی
نفس بکشید. پسوند را رها کنید و آنرا از
سوراخ بینی خارج کنید. این کار را برای سوراخ
دیگر بینی تکرار کنید.
مواظب باشید:
• استفاده برای افراد حساس به Ectoin®
با احتیاط کنید این محصول ممنوع است.
• از تماس کودکان دور نگه دارید.
• در دمای زیر ۲۵ درجه
سازنی نگه دارید.
• از ایجاد محصول منجمدی بپرهیزید.
• نسبت استفاده از محصول تا ۳
هفته پس از باز شدن آن است.
برای کسب اطلاعات بیشتر به برگه
راحتیهای درون بسته مراجعه کنید.
• این محصول برای استفاده در کودکان و نوجوانان
مناسب است.
• این محصول را دور از نور مستقیم و دماهای بالا
نگه دارید.

Bottle/ بطری
20ml

Nasal spray for treatment
and relief of allergic rhinitis
Marketing Authorisation
Manufactured by: M&S OTC
4020 Basel, Switzerland
Biosip AG, Stuttgart
Manufacturing Site:
Laboratoires Pharmacia
Sinoce s.r.l. - Via
S. Antonio 10 - 20138
Milano - Italy
REF 30624
20 ml CE

چرا اسپری بینی بتادین باید بعد از جراحی بینی استفاده شود؟



- بهبود آبریزش و بوی بد داخل بینی بعد از جراحی
- درمان گرفتگی بینی و سختی تنفس بعد از جراحی
- رفع التهاب غشای مخاط بینی، ورم و کبودی بعد از جراحی
- رفع قطعی خشکی مخاط بینی و خونریزی های بعد از جراحی
- درمان خارش و هر نوع تحریک های موضعی بینی بعد از جراحی
- پیشگیری و درمان آلرژی، سرماخوردگی و آنفلوآنزای بعد از جراحی بینی
- شستشوی سینوس ها و برطرف کردن سینوزیت و سردرد بعد از جراحی
- ترمیم سریع مخاط بینی و درمان زخم ها و اسکارهای داخل بینی بعد از جراحی
- تسریع جذب نخ بخیه ها و تخلیه ترشحات و لخته های خون خشک شده بعد از جراحی





مراقبت های درمانی بعد از جراحی بینی

- از کمپرس سرد استفاده کنید.
- استفاده از الکل و سیگار را قطع کنید.
- از تخلیه مخاط بینی با فشار بپرهیزید.
- تا دو هفته از جویدن غذای سفت خودداری کنید.
- برای جلوگیری از شکل گرفتن بینی، عینک نزنید و از نور آفتاب دوری کنید.
- از مواد حساسیت زا جهت کاهش ریسک بروز تورم در بینی و سینوس دوری کنید.
- به مدت حداقل دو هفته از تمرین شدید و بلند کردن اجسام سنگین خودداری کنید.
- هنگام خواب سر خود را بالا نگه دارید (باید در سطحی شیب دار و زاویه ۴۵ درجه باشد).
- استحمام پس از جراحی زیبایی بینی باید کوتاه و ترجیحاً با دوش کم فشار و دمای ولرم مایل به سرد باشد.
- برای دو هفته از خمیازه کشیدن با دهان کاملاً باز خودداری کنید و در هنگام عطسه دهان خود را باز نگاه دارید.
- جهت شست و شوی بینی، رفع التهاب و ترمیم سریع مخاط بینی حتماً اسپری بینی بتادین را به مدت حداقل یک ماه استفاده کنید.

چگونه

اسپری بینی بتادین
را بعد از جراحی بینی
استفاده کنم؟

بعد از خروج تامپون از بینی،

با پایین نگه داشتن سر با زاویه ۴۵ درجه
و با گرفتن سوراخ بینی طرف مقابل با دست،
یک الی دو پاف در هر سوراخ بینی اسپری کنید
و اینکار را روزانه سه مرتبه تکرار کنید.



۰۲۱۸۸۲۰۱۷۳۴



[kimiara.pharma](https://www.kimiara.pharma)



[kimiara.com](https://www.kimiara.com)

